Comment administrer correctement les vaccins "Triangle"

Le facteur santé de l'animal détermine la qualité et la quantité des

produits fabriqués, ce qui affecte le secteur de l'élevage.

La restriction de l'animal avant l'administration du vaccin est bénéfique

pour la protection, la sécurité de l'homme et le bien-être de l'animal. Si une

revaccination est nécessaire, il convient de suivre les instructions figurant

sur l'étiquette en ce qui concerne le calendrier et la fréquence.

L'administration du vaccin

L'animal doit d'abord être immobilisé et le point d'injection doit être

localisé. Cependant l'injection du « triangle » au niveau du cou qui

est situé sous le ligament nucal qui s'arrondit au sommet de la colonne

vertébrale, sous les vertèbres du cou et devant l'omoplate, est le point le

plus recommandé. Conservez les flacons et les seringues dans des endroits plus

frais, à l'abri de la lumière solaire et protégez les vaccins des températures

extrêmes. Rassurez-vous d'éviter la veine jugulaire et le ganglion lymphatique supra scapulaire.

De même, secouez doucement le flacon d'avant en arrière pour mélanger le

contenu du vaccin et ne le faites pas vigoureusement, car cela pourrait

endommager les composants du vaccin. Il faut toujours lire l'étiquette du

produit pour déterminer la dose appropriée, mais pour le « triangle »,

la dose et le mode d'administration varient selon le produit.

En cas d'utilisation d'une seringue multi dose, réglez

la dose correcte. Utilisez une nouvelle aiguille stérile pour prélever le vaccin dans le flacon. Une aiguille qui a été utilisée sur un animal peut contaminer tout le contenu du flacon. Choisissez la bonne aiguille en fonction

du mode d'administration et du poids de l'animal, puis tenez la seringue dans l'autre main et insérez l'aiguille au centre du bouchon en caoutchouc.

Ajustez également votre main en tenant la seringue et le flacon d'une main

et utilisez la main libre pour aspirer la dose de vaccin souhaitée dans la

seringue. Continuez en retirant l'aiguille du flacon et, tout en pointant

l'extrémité vers le haut, relâchez quelques vaccins pour éliminer l'air dans la

seringue ou l'aiguille afin d'obtenir un dosage précis. Assurez-vous que le

site d'injection est propre, sec et exempt de saletés et utilisez le mode

d'administration correct, tel qu'indiqué sur l'étiquette du vaccin.

Pour l'injection sous-cutanée, tirez la peau du cou de l'animal pour créer

une tente et insérez l'aiguille à la base de la tente, administrez le vaccin,

retirez l'aiguille et relâchez la peau. Pour l'injection intramusculaire, tenir

la seringue perpendiculairement à la peau, avancer l'aiguille dans le muscle,

administrer le vaccin et retirer l'aiguille.

Enfin, changez systématiquement d'aiguille et éliminez correctement les aiguilles tordues ou endommagées.