

»Kilimo cha Kabeji – Mawazo ya Biashara ya Shamba la Kabeji na Uwekezaji mdogo na Faida kubwa – Kukuza Kabeji«

Kama mboga ya kijani, ubora na wingi wa kabichi imedhamiriwa na aina na kiwango cha teknolojia inayotumiwa katika mchakato wa uzalishaji.

Kwa kuwa ni mojawapo ya mboga za majani zenye lishe na vitamini A, kilimo cha kabichi ya mapema kina mahitaji makubwa na yenye faida kubwa kwa kupanga na kutunza vizuri. Inaweza kupandwa katika aina zote za udongo hasa juu ya udongo na silt – loam.

Usimamizi wa kabichi

Wakati wa uzalishaji, miche huzalishwa kwenye kitanda cha mbegu na kupandwa kwenye shamba la ukubwa wa 1m * 2m (WxL) ambalo huandaliwa kwa kuchanganya mchanga, udongo na mbolea hai. Changanya mbolea vizuri kwenye kitanda cha mbegu siku 7–8 kabla ya kupanda mbegu na baadaye weka mbolea ya urea kwenye mche unaoota kwa ukuaji sahihi.

Vile vile, miche hupandwa kwenye kitanda cha mbegu siku 30–35 baada ya kupanda hivyo kuandaa ardhi kwa kulima kina mara 4–5 ikifuatiwa na kunyunyiziwa kwa mbolea sawasawa kwenye ardhi kwenye shamba la mwisho la kulima ambalo limechanganywa na udongo. Kitanda kilicho tayari cha mbegu kinapaswa kuwa na upana wa 1m na cm 15–20 kutoka ardhini.

Baada ya siku 30–35 za miche kwenye kitalu, panda kwenye ardhi kuu mchana kwa umbali wa cm 60*45 na uweke mbolea. Ongeza urea 300–350 kg, TSP 200–250kg na samadi tani 5–10. Mbolea zote hunyunyizwa sawasawa shambani kwenye kilimo cha mwisho na

kuchanganywa na udongo.

Zaidi ya hayo, mbolea hutumiwa kwa awamu 3 ambayo ni pamoja na siku 10 baada ya kupanda, siku ya 25 na wakati wa malezi ya kichwa cha kabichi. Ardhi inapaswa kumwagiliwa mara baada ya kuweka mbolea na kisha baada ya siku 2–3 pia.

Hatimaye, weka dawa za kuua wadudu na kuvu ili kuzuia magonjwa na kuvuna kabichi kati ya siku 60–90 baada ya kupanda.