La culture du Moringa à partir des boutures

Le Moringa se multiplie facilement par des boutures de tige. La multiplication de plantes à partir de boutures présente deux avantages distincts.

La production de plantes à partir de boutures est un moyen de propagation clonale. Cela signifie que la nouvelle plante aura les mêmes caractéristiques que la plante mère dont elle est issue. Ces caractéristiques comprennent : le taux de croissance, la forme de la croissance, les attentes en matière de rendement, la taille des feuilles des gousses et de fruits. La production de plantes à partir de boutures élimine également la phase juvénile. La phase juvénile est la période du développement d'une plante au cours de laquelle la plante est trop jeune pour produire des fleurs ou des graines.

Avantages

Les avantages de l'établissement d'un verger du moringa à partir de boutures sont les suivants : Un modèle de croissance uniforme, des attentes prévisibles en matière de rendement, un rythme de croissance uniforme et une période plus courte entre la plantation et la pleine production.

Les plants du moringa peuvent être produits à partir de boutures plantées
directement au champ ou à partir de boutures plantées dans des bacs ou récipients.

Boutures plantées au champ

Le bouturage en pleine terre ne doit être envisagé que dans des conditions
climatiques et de croissance idéales ou avec l'ajout d'une irrigation dans des
conditions chaudes et sèches.

Les boutures doivent être prélevées pendant la période de croissance active
sur des plantes mères saines. Les boutures peuvent avoir une longueur de 30 à
50 cm et un diamètre de tige d'au moins 3 à 5 cm. Les boutures sont plantées
directement dans des champs préparés et maintenues humides jusqu'à l'apparition
des racines et des feuilles.

Boutures en pots

Les boutures doivent avoir un diamètre supérieur à 1 cm et mesurer entre 20
et 30 cm de long. Les boutures doivent être plantées dans un bon mélange de
bouturage. Nous utilisons un mélange composé de 40 % de coco, 40 % de tourbe et
20 % de vermiculite.

La taille du pot à utiliser dépend du volume de production et de l'espace
disponible pour l'enracinement. Une hormone d'enracinement

peut être appliquée
sur la bouture pour accélérer l’enracinement. Après l’enracinement, placez les
pots dans un endroit bien éclairé et maintenez-les humides. N’oubliez pas
d’endurcir les plantes enracinées avant de les planter sur le terrain.