La gestion de la période transitoire

Il s’agit d’une période critique au cours de laquelle l’animal subit d’importants changements physiologiques, métaboliques et nutritionnels dans sa lactation.

La période de transition d’une vache laitière s’étend de trois semaines avant le vêlage à trois semaines après le moment du vêlage. Les pratiques de gestion de la transition permettent donc d’améliorer les performances des animaux et d’assurer des rendements élevés pour la création de revenus et la sécurité alimentaire.

Pratiques appropriées

Il faut toujours prévoir des espaces suffisants pour l’alimentation et le repos des animaux afin de réduire le stress. Il faut également prévoir des lieux d’hébergement familiers et éviter les changements fréquents de logement des animaux.

En plus, il convient de prévoir des compartiments ou box de vêlage séparés et de les entretenir de manière hygiénique afin d’éviter les maladies. Toutefois, le logement des animaux ne doit pas être glissant et le sol doit être maintenu sec.

En outre, apportez une aide au vêlage si nécessaire et, après le vêlage,
vérifiez que l’animal se nourrit, boit et rumine correctement.

Rassurez-vous de garder l’animal avec son groupe familier afin d’éviter un
environnement surpeuplé et compétitif, et fournissez-lui des concentrés à haute
densité au début de la lactation afin de le maintenir en bonne santé et de
réduire le bilan énergétique négatif.

Lors de l’alimentation, complétez les aliments avec des micro-nutriments
afin d’améliorer la santé des animaux et surveillez-les régulièrement.

Il convient également de respecter les pratiques de gestion des animaux en
hiver et en été, de fournir une ration équilibrée et d’éviter une augmentation
soudaine des concentrés. Enfin, il ne faut pas nuire à l’animal.