La gestion des pépinières du palmier à huile: 2è partie

Une bonne gestion des pépinières du palmier à huile
assure une bonne croissance des plantes et génère considérablement des revenus
pour l'agriculteur.

Pour un rendement maximal, assurez-vous de planter des
graines de palmier propres et de bonne qualité. Assurez-vous également de séparer les déchets organiques et inorganiques dans les champs de palmiers ainsi que de pulvériser des herbicides sur le sol entre le polyéthylène conservé
pour maximiser la croissance des plantules. De plus, manipulez les plantules avec
soin lors du repiquage pour éviter des pertes.

Les bonnes pratiques

Toujours irriguez les palmiers quotidiennement à l'aide
d'un arrosoir plat perforé pour la pré-pépinière et d'un arrosoir aérien dans la pépinière principale pour éviter la flétrissement des plantules. Maintenez également la pression d'eau requise à l'aide de manomètres et de vannes d'arrêt
pendant l'irrigation pour éviter d'endommager les plants. De plus, vérifiez régulièrement les conduites d'eau et débloquez les tuyaux bouchés pour assurer un débit d'eau constant vers
les cultures, puis plantez les semences.

En outre, embauchez des personnes bien formées pour
appliquer les engrais à l'aide de récipients calibrés et éviter tout contact entre les semences et l'engrais. Par la suite, paillez en utilisant des coquilles
des noyaux du palmier à 2,5 cm de profondeur autour de la plante pour minimiser
la perte d'humidité, supprimer les mauvaises herbes, fournir des nutriments

et
prévenir l’érosion. De plus, assurez le contrôle des mauvaises herbes et des déchets pour maximiser la croissance des plantules tout en surveillant et en contrôlant constamment les ravageurs.

Après le repiquage, éliminez les plants chétifs et
surveillez la croissance à partir du 4è mois après la plantation des graines. Faites un échantillonnage aléatoire des plantes pour analyser la progression de
la croissance et à 6-7 mois après le repiquage, éliminer les arbres à faible croissance. Enfin, après 8 mois, taillez les racines dans les sacs en polyéthylène pour éviter le choc des plants et arrosez abondamment les plantules
avant le repiquage pour éviter le choc de repiquage et l’avortement des fleurs.