L’entretien des palmiers avant la maturité

Une bonne gestion des palmiers avant la maturité permet d’obtenir des
rendements élevés et la phase de gestion des palmiers avant la maturité
commence au moment du repiquage des jeunes plantules.

La phase d’immaturité commence lorsque les jeunes plantules sont repiquées.
Couvrez les champs de palmiers à huile avec des légumineuses, qui fixent
l’azote et contrôlent l’érosion du sol. Il convient d’être très prudent lors du
repiquage afin d’éviter le stress du repiquage. Il est fortement recommandé de
cultiver des palmiers sur des terres dégradées afin de minimiser les coûts de
défrichement. En outre, il faut cultiver des palmiers sur des terres dégradées,
puis appliquer des herbicides et planter des légumineuses. Construisez des
routes d’accès sans altérer la couche arable, car celle-ci contient beaucoup
d’éléments nutritifs.

Les techniques de la mise en place

Commencez par déterminer la zone de plantation et effectuez une étude du
sol afin d’analyser les conditions du sol et d’en déterminer les propriétés.
Appliquez ensuite des engrais pour augmenter la teneur en

éléments nutritifs du
sol. Évitez toutefois de cultiver des palmiers sur des sols de texture sableuse.
En outre, créez un plan logistique pour déterminer facilement et maximiser
l'utilisation des terres et, lors de la plantation, déterminez la densité de
plantation en fonction de la fertilité du sol. Construire également des courbes
de niveau sur les pentes pour contrôler l'érosion du sol et le ruissellement
incontrôlé.

L'application d'engrais

Commencez par appliquer 50-100 kg de NPK une semaine après, couvrez la germination des graines de pour accélérer
la croissance de la plante. Ensuite, appliquez des engrais à base du compost
pour stimuler la croissance. En outre, appliquez du NPK et du magnésium pendant le désherbage pour
compléter les nutriments du sol. Enfin, entourez les plantes par des noix de
palme vides pour augmenter la teneur en nutriments du sol.

Les pratiques de gestion

Lors de la plantation, creusez des trous de 10 cm de large selon un schéma
triangulaire, puis semer des graines de légumineuses de couverture mélangées à
du phosphate naturel. En outre, désherbez au cours du

troisième mois de
croissance de la plante de couverture.
Appliquez régulièrement des herbicides
pendant les 20 mois suivants et toujours transplantez les plantules avec soin
et effectuez des recensements hebdomadaires pour déterminer le schéma de
croissance de la culture. Enfin, il faut irriguer les plantes pour assurer leur
bonne croissance et éviter qu’elles ne subissent un stress. Enfin, désherbez
les alentours des plantes pour les aider à tirer profit des engrais.