

Les choses à faire et à ne pas faire en matière de division et d'unification des colonies

Pour garantir l'efficacité du processus de division ou d'unification, les opérations doivent être effectuées au moment opportun et avec les compétences requises. Pour procéder à une division de colonie, la colonie doit être plus forte, la ruche doit être de la même dimension que sa sœur et la division ou l'unification de la colonie doit avoir lieu pendant la période d'essaimage.

Division de la colonie

Assurez-vous qu'après la division de la colonie, l'ancienne et la nouvelle ruche sont proches l'une de l'autre. Cela permet à la phéromone produite par la reine de l'ancienne colonie de maintenir les abeilles de la nouvelle ruche ensemble pendant que la reine de la nouvelle ruche se développe.

Veillez à nourrir les abeilles avec du sirop de sucre pour maintenir la productivité des colonies à un niveau élevé.

Effectuez la division de la colonie lorsque les conditions sont chaudes afin de minimiser

le stress.

Unification de la colonie

Veillez à effectuer l'unification au moment de l'essaimage.

Veillez à ce que les deux ruches à réunir soient proches l'une de l'autre.

L'unification des colonies a pour but de réunir deux colonies faibles en une seule colonie forte.

Veillez à ce que les abeilles soient de la même espèce, avec des caractéristiques et des gènes similaires.

Veillez à ce que les deux ruches soient équipées d'appâts pour éliminer les mauvaises odeurs.

Faites-le lorsqu'il y a un minimum de trois rayons par ruche.